



DE Gebrauchsinformation

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin Gel beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was ist Xailin Gel?

Xailin Gel ist ein Augengel im Mehrdosissystem zur lang anhaltenden Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge. Die Packung enthält 10 g steriles Augengel.

Zusammensetzung:

Xailin Gel enthält Carbomer 2 mg/g, Natriumperborat und Hilfsstoffe. Xailin Gel enthält ein verschwindendes Konservierungsmittel, das beim Kontakt mit Ihrem Auge in Wasser und Sauerstoff zerfällt. Damit wird die Reizung, die von traditionellen Konservierungsmitteln ausgehen kann, minimiert und dennoch der Komfort eines Mehrdosensystems beibehalten. Sie spüren nur die kühlende und wohltuende Linderung durch das Gel.

Wann wird es angewendet?

Xailin Gel wird als Gleit- und Schutzmittel für das Auge bei bestimmten Augenerkrankungen sowie für eine lang anhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl der Augen angewendet.

Xailin Gel schafft eine kühlende und wohltuende Linderung der Symptome des Trockenen Auges wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten.

Xailin Gel ist für Kontaktlinsenträger geeignet, die Linsen sollten vor der Anwendung jedoch herausgenommen werden.

Art der Anwendung:

Die übliche Dosis ist ein Tropfen, je nach Bedarf zwei- bis viermal täglich anwendbar, oder nach Anweisung Ihres Arztes, der Ihnen eine andere Anwendung empfehlen kann. Bei Kindern ist keine Dosisanpassung erforderlich.

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen einer neuen Tube Xailin Gel, dass der Sicherheitsring an der Tubenkappe unverseht ist.

1. Drehen Sie die Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn um die Versiegelung zu lösen
2. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut
3. Nehmen Sie die äußere Kappe ab
4. Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, nehmen Sie Ihre Linsen ab
5. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben
6. Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten und träufeln Sie einen Tropfen Xailin Gel in den Spalt zwischen Auge und Lid
7. Blinzeln Sie mehrere Male
8. Wenn Sie glauben, dass Sie das Auge verfehlt haben, bringen Sie einen weiteren Tropfen ein
9. Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssiges Xailin Gel um das Augenlid ab

10. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich, für das andere Auge

11. Setzen Sie die äußere Kappe wieder auf das Behältnis. Vermeiden Sie dabei, die Applikatorspitze mit etwas zu berühren, einschließlich Ihres Auges oder Ihrer Finger

12. Halten Sie zwischen der Anwendung und anderen Augenarzneimitteln einen zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten ein

Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie Xailin Gel anwenden sollen, oder falls Ihre Augenbeschwerden anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring an der Tubenkappe beschädigt ist
- Nicht anwenden, wenn Sie auf das Produkt allergisch reagieren
- Die Tubenspitze nicht mit dem Auge oder einer Oberfläche berühren
- Verwenden Sie Xailin Gel nicht gemeinsam mit einer anderen Person
- Xailin Gel kann nach der Anwendung vorübergehend zu leichtem Brennen und/oder verschwommenem Sehen führen. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug lenken oder Maschinen bedienen
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden, das auf dem Umkarton oder dem Tubenzalag angegeben ist
- Zwischen 1°C und 25°C lagern
- Inhalt 28 Tage nach Anbruch verwerfen
- Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren
- Nur zur äußerlichen Anwendung am Auge, nicht schlucken
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor Anwendung von Xailin Gel Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker um Rat
- Entsorgen Sie die angebrochene Tube entsprechend den lokalen Entsorgungsvorschriften

nicox Vertrieb durch Nicox Pharma, CS10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, Frankreich - nicoxpharma@nicox.com

Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, PO14 4PJ, U.K.



Zwischen 1°C und 25°C lagern



Achtung, bitte Gebrauchsinformation beachten



Inhalt 28 Tage nach Anbruch verwerfen



Gebrauchsinformation beachten



Steril durch Anwendung aseptischer Verfahren

Xailin ist eine Handelsmarke von Nicox
Stand der Information: Oktober-2013